

## Como é realizado o trabalho da ADAPI para controlar a doença?

- Através de orientações aos produtores quanto a importância da vacinação antirábica como forma de prevenção da doença.
- Através da captura dos morcegos hematófagos nos abrigos e propriedades rurais, quando estão atacando os animais de produção, realizada exclusivamente pela ADAPI.
- Cadastramento e monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos.
- Coleta de material dos animais acometidos na propriedade para diagnóstico da Raiva.
- Orientar sobre a utilização por parte do produtor da pasta vampiricida nas ferimentos dos animais causados pela mordida do morcego.

IMPORTANTE: Procurar a ADAPI em caso exista uma grande quantidade de animais sendo



@ [adapi@adapi.pi.gov.br](mailto:adapi@adapi.pi.gov.br)

86 99462-1644



[portal.pi.gov.br/adapi/fale-conosco/](http://portal.pi.gov.br/adapi/fale-conosco/)

Em caso de dúvidas, procure um escritório da ADAPI mais próximo ou os nossos canais de atendimento!



A Raiva além de ser fatal aos animais é uma zoonose e pode ser transmitida ao homem!

PECRH e EETs (Programa estadual de controle da Raiva dos Herbívoros)



## O que é a Raiva dos Herbívoros?

Doença infectocontagiosa fatal, transmitida aos animais mamíferos domésticos de produção e ao homem, que apresenta inicialmente sinais neurológicos, levando posteriormente o animal ao óbito.

## Como é transmitida a doença?

É transmitida através da mordida do morcego hematófago (que se alimenta de sangue) contaminado com o vírus, ou contato direto da saliva dos animais contaminados com a mucosa ou ferida aberta na pele.



## Quais os sintomas da doença?

Isolamentos do rebanho, dificuldade de se alimentar, salivação constante, incoordenação motora, paralisia dos membros posteriores, movimentos de pedalagem, prostração e óbito.

O produtor deve procurar a ADAPI caso algum animal bovino da propriedade apresente alguns desses sintomas.



## A doença tem tratamento?

Não existe tratamento, portanto o produtor deve prevenir a transmissão da doença nos animais através da aplicação da vacina, que é muito eficaz, evitando o prejuízo com a morte dos animais.

## Como é feita a aplicação da vacina nos animais?

É feita pelo produtor através de aplicação de 2 ml do produto por via intramuscular ou subcutânea nos animais de produção a partir de 3 meses de idade, uma vez ao ano.

IMPORTANTE: Os animais primo vacinados, ou seja, os que vão receber a primeira dose de vacina, deverão tomar um reforço inicial após 30 dias, só assim a eficácia da vacina será completa.



## O que eu devo fazer caso encontre algum animal de produção com sinais nervosos na propriedade?

Primeiramente, isolar o animal com cuidado para evitar contato com pessoas ou outros animais, procurar imediatamente a ADAPI ou um Médico Veterinário, para que possam ser tomadas as devidas providências.